

# TOS FERINA

Información para centros escolares

Es una infección bacteriana (*bordetella pertussis*)

## PERIODO DE INCUBACIÓN

Es el tiempo comprendido entre la exposición al agente biológico, y la aparición de los signos y síntomas

Suele ser de 9 a 10 días..

## ¿CÓMO SE TRANSMITE?



Persona - persona.  
Secreciones vía respiratoria.  
Contacto estrecho prolongado

## ¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Síntomas:

- Tos repetitiva con sonido (estridor)
- Vómitos provocado por la tos.
- Fiebre en ocasiones



## ¿CÓMO SE DETECTA?

Exudado nasofaríngeo



## ¿SE PUEDE PREVENIR?

Sí, gracias a las vacunas

## ¿TIENE TRATAMIENTO?

SÍ

Antibióticos:  
de elección  
**Azitromicina**

Para personas  
sintomáticas  
y los contactos  
de alto riesgo

Revisar estado vacunal

## Calendario vacunación 2024

2 meses

DTPa

4 meses

DTPa

11 meses

DTPa

6 años

DTPa

Embarazadas

A partir de la 2ª semana  
Tdpa

## ¿NECESITA AISLAMIENTO?

- Hasta 5 días después de iniciado el tratamiento antibiótico.
- Si no se ha dado tratamiento hasta 21 días después del inicio de los síntomas

### RECUERDA

Usa mascarilla  
y haz higiene  
de manos si  
tienes síntomas

FUENTE:

<https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

[https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud\\_5a95879cd397\\_p\\_tosferina.pdf](https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5a95879cd397_p_tosferina.pdf)

**Junta de Andalucía**

Consejería de Salud y Consumo  
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD  
AGS Campo de Gibraltar Oeste y Este